www.fr.ch/vaccination-covid

## COVID-19 : Recommandations de vaccination automne 2022 (Etat au 10 octobre 2022)

	Vaccination de base		Vaccination de rappel	
	Nombre de doses recommandées	Vaccins	Nombre de doses recommandées	Vaccins
Enfants et adolescents de 5 à 15 ans				
5 à 11 ans	Aucune vaccination recommandée		Aucune vaccination de rappel n'est recommandée	
5 à 11 ans avec maladie chronique <sup>1</sup>	1 dose (2 doses possibles)	Pfizer	Aucune vaccination de rappel n'est recommandée	
5 à 11 ans immunodéficience sévère	2 doses + sérologie. En l'absence d'anticorps, 3 <sup>ème</sup> dose	Pfizer	Aucune vaccination de rappel n'est recommandée	
12 ans à 15 ans	Aucune vaccination recommandée		Aucune vaccination de rappel n'est recommandée	
12 à 15 ans avec maladie chronique <sup>1</sup>	1 dose (2 doses possibles)	Pfizer	Aucune vaccination de rappel n'est recommandée	
12 à 15 ans immunodéficience sévère	3 doses	Pfizer	1 dose <sup>5</sup>	Moderna bivalent Pfizer
Personnes à partir de 16 ans				
16 ans à 64 ans	1 dose <sup>2</sup>	Pfizer <sup>3</sup> Moderna monovalent Nuvaxovid <sup>4</sup>	1 dose <sup>5</sup>	Moderna bivalent Nuvaxovid <sup>4</sup> Pfizer
65 ans et plus, autres personnes vulnérables <sup>1</sup>	2 doses	Pfizer Moderna monovalent Nuvaxovid <sup>4</sup>	1 dose <sup>5</sup>	Moderna bivalent Nuvaxovid <sup>4</sup> Pfizer
Personnel de santé, personnes assurant la prise en charge des personnes vulnérables <sup>1</sup>	1 dose <sup>2</sup>	Pfizer <sup>3</sup> Moderna monovalent Nuvaxovid <sup>4</sup>		Moderna bivalent Nuvaxovid <sup>4</sup> Pfizer
16 ans et plus immunodéficience sévère	3 doses	Pfizer <sup>3</sup> Moderna monovalent	1 dose <sup>5</sup>	Moderna bivalent Pfizer

- 1 Personnes avec maladies chroniques : <u>catégories de personnes vulnérables</u>, trisomie 21, femmes enceintes.
- 2 Ne donne pas droit à un certificat COVID mais uniquement à un justificatif.
- 3 Pfizer pour les moins de 30 ans.
- 4 La vaccination avec le Nuvaxovid n'est pas recommandée pour les femmes enceintes ou qui allaitent.
- 5 L'intervalle écoulé depuis le précédent vaccin contre le COVID-19 ou une infection avérée au COVID-19 doit être de 4 mois au moins.